

Ūkininkavimo praktikos, palankios bioįvairovei:

Durpingos pievos

Durpingų pievų atkūrimas

Šienaujantiems durpingas
pievas

Ganantiems durpingas
pievas



NATURALIT



NATURA 2000



BEF
LITHUANIA



Bendrai finansuoja
Europos Sąjunga

DURPINGŲ PIEVŲ ATKŪRIMAS

Durpžemiai – tai organinės kilmės dirvožemiai, susidarę pelkėjimo metu ir paviršiuje turintys ne plonesnį kaip 30 cm durpių sluoksnį.

Dėl nuolatinės drėgmės ir riboto deguonies kiekio augalų liekanose, augalai nevisiškai suyra ir ilgai susikaupia, sudarydami durpes.

Sveikose durpingose pievose auga augalai, prisitaikę prie ilgalaikės drėgmės ir šienavimo sąlygų, kurie padeda formuoti durpių sluoksnį bei palaikyti biologinę įvairovę.

Machaonas
(*Papilio machaon*)

Baltoji smilga
(*Agrostis
stolonifera*)

Stirna
(*Capreolus
capreolus*)

HIDROLOGINIO REŽIMO ATKŪRIMAS

Atkurkite natūralų hidrologinį režimą (pasikonsultavę su hidrologijos ekspertais):

- užtvėnkiant melioracijos griovius reguliuojamomis pertvaromis;
- užkemšant drenažo sistemas;
- įrengiant pylimus ar užtvankėles.

TINKAMŲ ŽOLYNŲ ATKŪRIMAS:

Atkurkite durpynams tinkamus žolynus, pasirinkdami žoles, atsparias užliejimui, aukštam gruntinio vandens lygiui ir šienavimui: pievinis pašiaušėlis, nendrinis dryžutis, pelkinė miglė, baltoji smilga. Sausesnėse vietose galima įmaišyti pievinę miglę ir atidžiai pasirinkti ankštinių augalų rūšis.

ŪKINĖ VEIKLA

Derinkite ūkinę veiklą su ekosistemos apsauga: šienaukite drėgnesnes vietas, po šienavimo ganykite gyvulius.

AGRARINĖS APLINKOSAUGOS IŠMOKOS:

Skatinkite biologinės įvairovės išsaugojimą ir naudokite agrarinės aplinkosaugos išmokas ūkininkams, tvarkantiems atstatytas durpingas pievas pagal priemonėse nustatytą tvarką. Daugiau apie priemones ir išmokas skaitykite [ČIA](#).

Čia aptinkamos rūšys:

Paukščiai: didžioji kuolinga (*Numenius arquata*), perkūno oželis (*Gallinago gallinago*).

Vabzdžiai: tamsioji šaškytė (*Melitaea diamina*), machaonas (*Papilio machaon*), uodeguotasis melsvys (*Cupido argiades*).

Ropliai ir varliagyviai: geltonskruostis žaltys (*Natrix natrix*), gyvavedis driežas (*Zootoca vivipara*), kūmutės (*Bombina bombina*).

Žinduoliai: šikšnosparniai (*Chiroptera*), briedis (*Alces alces*), stirna (*Capreolus capreolus*).

ŠIENAUJANTIEMS DURPINGAS PIEVAS

Šienavimas durpingose šlapiose pievose padeda išlaikyti natūralius atvirus žolynų plotus su jose esančia biologine įvairove. Labai svarbu rūpintis velėnos būkle, nes jos dėka ūkiniai darbai yra galimi net ir dažnai šlapiose pievose. Nors žolės biomasė iš tokių pievų dažnai yra tik šalutinis produktas, daugėja jos panaudojimo galimybių (žr. „[Nušienauta biomasė: palikti ar surinkti?](#)“).

Didysis auksinukas
(*Lycaena dispar*)



VELĖNOS IR ŽOLYNO BŪKLĖS IŠSAUGOJIMAS

Šienaukite prisitaikydami prie žolyno būklės ir vandens lygio. Ypač atidžiai stebėkite ir sulaukite tinkamo laiko šienavimui vėsiais bei drėgnais metais, kad nepažeistumėte velėnos.

Pirmą žolę geriausia pjauti plaukėjimo-žydėjimo metu, dažniausiai birželio pabaigoje. Anksčiau galima šienauti pievinius pašiaušėlius, šunažoles, nendrinius dryžučius, dirses; vėliausiai – žolynus su motiejukais, baltosiomis smilgomis ir kt.

Stirna
(*Capreolus capreolus*)



Gyvavedis driežas
(*Zootoca vivipara*)



ŠIENAVIMO PLANAS

Šienaukite nuo centro į pakraščius, naudokite baidytuvus.

Pašarams atolą geriausia pjauti rugsėjį, kad žolė spėtų atsigauti iki šalnų, bet taip pat neperaugtų iki kito vegetacijos sezono ir pavasarį netrukdytų augti naujai žolei bei nepablogintų pievos būklės.

Čia aptinkamos rūšys:

Paukščiai: stulgys (*Galinago media*), maitinasi mažasis erelis rėksnys (*Clanga pomarina*).

Žinduoliai: šikšnosparniai (*Chiroptera*), stirna (*Capreolus capreolus*).

Vabzdžiai: didysis auksinukas (*Lycaena dispar*), tamsioji šaškytė (*Melitaea diamina*), uodeguotasis melsvys (*Cupido argiades*), žvilgantysis auksinukas (*Lycaena hippothoe*), žiedmusės (*Syrphidae*).

Ropliai ir varliagyviai: geltonskruostis žaltys (*Natrix natrix*), Gyvavedis driežas (*Zootoca vivipara*), kūmutės (*Bombina bombina*).

GANANTIEMS DURPINGOSE PIEVOSE

Durpingos pievos su natūraliu hidrologiniu režimu yra tinkamos mėsinei galvijininkystei, nes galvijai atsparūs, nereiklūs ir gerai prisitaiko šlapesnėse pievose. Ganymas užkerta kelią krūmų ir medžių augimui bei kontroliuoja invazines svetimžemes rūšis.


Barsukas
(*Meles meles*)



Mėšlamusė
(*Scathophaga stercoraria*)



Didžioji kuolinga
(*Numenius arquata*)



PLANUODAMI ATSIŽVELKITE Į

Veislių tinkamumą ganytis šlapesnėse pievose, gyvūnų geroje, jų prisitaikymą prie sąlygų, priežiūros ir maitinimo poreikius, taip pat ekonominius aspektus.

Intensyvumą – gyvulių skaičių visame plote (SG/ha).

Trukmę – ilgiau laikant viename aptvare, gyvulių skaičius turėtų būti mažesnis.

Laiką – ypač, faunai svarbiose teritorijose.

Pusiausvyrą tarp ilgo, santykinai mažo intensyvumo, ganyimo laikotarpio ir trumpesnio, intensyvesnio ganyimo režimo (apsvarstykite rotacinio ganyimo sistemos pritaikymą).


GYVŪNAI, TINKAMI GANYTI ŠLAPIOSE DURPINGOSE PIEVOSE

Galvijai – neselektyvūs žolėdžiai, todėl ganymas riboja dominuojančių žolių įsigalėjimą; rinkitės smulkesnes, prie aukšto gruntinio vandens prisitaikančias veisles (Herefordai, Angusai, Heko, Škotų hailendai).

Arkliai ir poniai – dažniai ganomi kartu su galvijais.

Daugiau apie ganyimą šlapynėse skaitykite [ČIA](#).

Rudoji lapė
(*Vulpes vulpes*)



Čia aptinkamos rūšys:

Paukščiai: didžioji kuolinga (*Numenius arquata*), perkūno oželis (*Gallinago gallinago*).

Žinduoliai: barsukas (*Meles meles*), rudoji lapė (*Vulpes vulpes*).

Vabzdžiai: Paprastasis mėšlavabalis (*Geotrupes stercorarius*), mėšlamusė (*Scathophaga stercoraria*).